



ਸ਼੍ਰੀ ਮਤੀ ਜੀ ,
ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੇਦੀਆਤਰਾ (ਬਚਿਆ ਦਾ ਡਾਕਟਰ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ (Servizio Sanitario) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣਨ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਚੈਕਅਪ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ (ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੋਂ) ਪਰਮੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸੰਜੋਰਨੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ(Ricevuta riconosciuta ਵੀ ਚਲਗਾ)।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਾਰਪੀ (Carpi) ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾ ਤੁਸੀ ਕਾਰਪੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਾਓ. ਪਤਾ ਕਾਰਪੀ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਸਾਲੇ ਦੋਨਾਤੋਰੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਸਪੋਰਟੈਲੋ(ਗੋਟ) ਨੰਬਰ 11 ਪੇਲੀਆਬੁਲਾਡੋਰੀਓ (sportello 11 del Poliambulatorio- piazzale Donatori - ospedale di Carpi), ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ Soliera ਜਾਂ Campogalliano ਜਾਂ ਫਿਰ Novi ਤਾ ਤੁਸੀ SAUB ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟੈਲੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਓ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾ ਤੁਸੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ SAUB ਦਫਤਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚੇ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਥੇ ਬਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਥੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਮੂਨੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਂਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਨਵਾ ਬਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣਾ ਐਂਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰਿਕ ਤੋਰ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਤੋਰ ਤੇ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ . ਤੁਸੀ ਇਹ ਸਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਗਰਭਵਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ (ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਨਸੁਲਡੋਰੀਓ-Consultorio) ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਾਉ।

ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ 7 ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ALLATTAMENTO ਦੁਧ ਪਿਲਾਉਣਾ

ਮਾਂ ਦਾ ਦੁਧ ਬਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਚੇ ਨੂੰ ਦੁਧ ਪਿਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਬਚੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਕੁਨਸੁਲਡੋਰੀਓ (Consultorio) ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆ ਕਿ Ostetriche ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਹਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਨਸੁਲਡੋਰੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਦਾਈ ਡਾਕਟਰਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਵਧਾਈਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

LA SPIRALE

ਲਾ ਸਪੀਰਾਲੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :-

ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਲੈਂਕਸੀਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਕੁਝ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰੋਂ ਵਿਚ ਫਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 100 ਔਰਤਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੋ(2) ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੀਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰਜ਼(Spermatozoi) ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਪੀਰਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਤਾਬੇ ਦੀ ਈਓਨੀਆ (Ioni) ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਪੀਰਾਲੇ ਪਰੋਜਿਤੇਰੋਨੇ(Progesterone) ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ।

ਕਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ :-

ਇਹ ਸਪੀਰਾਲੇ ਦਵਾਈਆ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ(Farmacia) ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਈ ਡਾਕਟਰ (ਯਨੀਕੋਲਗੋ-Ginecologo) ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ(3-5) ਸਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ।

ਕਿਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :-

ਯਨੀਕੋਲਗੋ (Ginecologo) ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਤੇਰੋ(Utero) ਅਤੇ ਓਵਾਈਟੈਂਸ (Ovule) ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਕ ਪਾਪ ਟੈਸਟ (Pap Test) ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਹਮਾਰੀ (Mestruazioni) ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ, ਇਹ ਉਤਰੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਨਾਲ ਲਗੀ ਹੋਈ ਤਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਗਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਛੂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਕੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਇਸਨੂੰ ਚੈਕ ਕਰਵਾ ਲਉ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੇਲਾ ਅਤੇ ਕੋਨਡਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਪੀਰਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘਟ ਕੇਸ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(Effetti Collaterali)

ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ :-


ਤਾਥੇ ਦੇ ਅਸਰ ਵਾਲੇ ਸਪੀਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆ ਨਾਲ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਦ।

ਜਿਹੜੀਆ ਜਵਾਨ ਔਰਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਖਮ ਹੋ ਜਾਣ।

ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਰਾਲੇ ਪਰੋਜਿਤੇਰੋਨੇ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬਾਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨਸੁਲਟੇਰੀਓ ਫਾਮੀਲੀਆਰੀ(Consultorio Familiare) ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਲਉ ਜੇਕਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਆਉਂਦੀਆ ਹਨ:-

- ਵਿਡ ਵਿਚ ਦਰਦ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ।
- ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਉੱਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

LA CONTRACCONEZIONE INIETTORIA

ਕੋਨਡਰਾਜੀਸਿਓਨ ਈਨੇਟੋਰੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :-

ਇਹ ਇਕ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਵਿਚ (Medroxyprogesterone) ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਰੜ ਨਾ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਕ ਟੀਕਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਟੀਕਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰ (1000) ਔਰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ (3) ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :-

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ (Medico ginecologo) ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਬਾਹ ਜਾਂ ਚੂਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 4 ਜਾਂ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫਾਇਦੇ:-

ਇਸਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਰਹੋ ਹੋ।

ਟੀਕਾ ਲਗਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਨੂੰ ਦੂਧ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਹਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਉਵਾਈਏ ਵਾਲੇ Cancro dell'ovaio e endometrio) ਕੈਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨੁਕਸਾਨ:-

ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਉ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਠਹਿਰੇ।

ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦਰਦ ਰਹਿਣ।

ਕੀਮਤ:-

ਹਰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ੀਤਾ (Visita) ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਲਗਣਗੇ।

PILLOLA

ਪੀਲੋਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :-

ਇਹ ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ . ਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਲੋਲਾ ਕੋਮਬੀਨਾਤਾ(Pillola Combinata) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸਤਰੋਜੋਨੀ ਅਤੇ ਪਰੋਜਿਸਤਰੋਨ (Estrogeni e progesterone) ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨੀ ਪੀਲੋਲਾ (Mini Pillola) ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਪਰੋਜਿਸਤਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ . ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੀਲੋਲਾ ਕੋਮਬੀਨਾਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਮੀਨੀ ਪੀਲੋਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੀਰਜ(Spermatozoi) ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਇਹ ਪੀਲੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ , ਪਰ ਇਹ ਉਹੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :- ਏਡਜ਼. ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਨਡਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ .

ਇਹ (ਪੀਲੋਲਾ) ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ :-

ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਲੋਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ.

ਇਹ ਕਿਦਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (21 ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਪੈਕਟ)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆ ਸਲਾਹਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖੋ:-

ਪਹਿਲਾ ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆਪਣੇ ਮਾਹਮਾਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ . ਇਹ ਗੋਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਬਾਏ ਸਾਬਤੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ.

ਹਰ ਛੱਬੀ ਦੇ ਪਿਛੇ ਐਰੋ (ਡਰੈਕਸ਼ਨ) ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਸੀ ਹੈ .

ਜੇਕਰ ਪੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ (7) ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਠਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਉਹੋ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਕਟ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ.

ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਰਤ ਆਪਣਾ-ਆਪ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ . ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਐਰਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਖਾਈਆ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀ ਖਾਦੇ ਹੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਉ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਭੁਲ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਉ ਪਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਨਡਮ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੋਲੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਦੇ ਜਾਓ.

ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆ ਦਵਾਈਆ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੀਲੋਲਾ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਂਦੀਆ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਉ .

ਸਾਈਡਾਫੈਕਟ:-

ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਰਦਾ ਹੋਣ, ਬਲੀਡਿੰਗ

ਹੋਵੇ ਜਾ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਹੋਵੇ.

ਸਾਰੀਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆ ਦਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਰ ਇਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਅਲਗ- ਅਲਗ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੈਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ.

ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ , ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਲੇਲਾ

ਛੱਡਣੀ ਪਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:- ਭਾਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਲਤਾ ਮੋਟੀਆ ਹੋਣੀਆ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ

ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ

ਲਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਲੇਲਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਉ.

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਲੇਲਾ ਖਾਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੈਡਪ੍ਰੈਸਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖੋ.

ਕਿਹੜੀਆ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀਆ:-

- ਜਿਹੜੀਆ ਬਹੁਤ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਦੀਆ ਹਨ (15 ਸਿਗਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ)
- ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆ ਜਿਆਦਾ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਦੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆ ਹਨ.
- ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂਬੋਜੀ ਅਤੇ ਫਲੇਬੀਤੀ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੋਵੇ
- ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ
- ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇ.